

خطر شیوع بیماری لکه غربالی در باغات به دلیل بارندگی



**مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت
زا سازمان حفظ نباتات کشور به باغداران
نسبت به شیوع و طغیان بیماری لکه غربالی با
ادامه بارندگیها در درختان میوه هسته دار
هشدار داد.**

محمدزاهد رجبی در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: به موجب بارندگیها و افزایش رطوبت هوا امکان توسعه بیماریهای قارچی از جمله لکه غربالی در باغ ها وجود دارد.

وی به تمامی کشاورزان بالخصوص مناطق کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، همدان، خراسان شمالی و رضوی، استان های شمالی کشور توصیه کرد نسبت به عملیات کنترل و پیشگیری این بیماری اقدام کنند.

مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بیماری لکه غربالی از جمله مهمترین بیماریهای درختان

میوه است که در صورت عدم مبارزه به موقع باعث ضعف درختان، کاهش مقدار و ارزش محصول می شود.

وی با بیان اینکه سمپاشی درختان با سموم «مسی» و «بردو» در کنترل بیماری مزبور بسیار موثر است به باغداران استان توصیه کرد در چند روز آینده باغ های خود را با استفاده از ترکیبات محلول های کم خطر «بردو» یا «اکسی کلر مس» سمپاشی کنند.

رجبی با تصریح اینکه بیماری لکه غربالی در درختان میوه هسته دار مانند زردآلو، گیلان، آلبالو، گوجه، هلو، شلیل و بادام مشاهده می شود، اظهار داشت: نخستین نشانه های این بیماری روی برگ ها به صورت سوراخ شدن و حالت غربالی برگ است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از وجود سه هزار شبکه پیش آگاهی و مراقبت از محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: دو هزار شبکه مردمی و غیر دولتی و یک هزار شبکه دولتی است.

مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت را سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد: پیش آگاهی بهترین راه برای تعیین روش های مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی است.

انتهای پیام/