

احتمال انتقال یک نوع عفونت خاص با مصرف غذای دریایی خام



نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد غذاهای دریایی خام می‌توانند منابع بالقوه عفونت توکسوپلازما و انتقال دهنده این عفونت به انسانها باشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگرو فود نیوز)، به نقل از ایسنا، آلودگی به توکسوپلازما گوندی از شایع‌ترین عفونت‌های انگلی انسان در جهان است.

اوویست‌های (تخم) این انگل، که از گربه‌های آلوده دفع می‌شوند، خاک را آلوده می‌کنند. اوویست‌های موجود در خاک با جریان سیلاب ناشی از بارش باران و کانال‌های زهکشی آب شیرین، به رودخانه‌ها و سپس به آب‌های ساحلی منتقل می‌شوند. به دلیل آلودگی آب‌های شیرین و آب دریا با انگل توکسوپلازما، احتمال آلودگی صدف‌ها، پستانداران دریایی و حیوانات دریایی خونسرد وجود دارد.

بر اساس اعلام پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور، نتایج یک مرور نظام‌مند مطالعات اولیه صورت گرفته در نقاط مختلف جهان با موضوع «عفونت توکسوپلازما در حیوانات خونسرد و نرم‌تنان» نشان داد که صدف‌ها و حیوانات خونسرد می‌توانند منابع بالقوه عفونت توکسوپلازما و انتقال آن به انسانها یا سایر میزبان‌هایی که از آنها تغذیه می‌کنند باشند.

محققان این مطالعه اعلام کردند: آگاه کردن افراد جامعه نسبت به خطر خوردن غذاهای دریایی خام ضرورت دارد. همچنین اجرای مطالعات اولیه بیشتر برای برآورد دقیق شیوع عفونت توکسوپلازما گوندی در حیوانات خونسرد و نرم‌تنان پیشنهاد می‌شود.

این پژوهش توسط توران نیری، شهاب‌الدین سروی و احمد دریانی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است و نتایج آن در مجله Parasitology به چاپ رسیده است.

سرویس خبری: علمی و تغذیه و سلامت

منبع: ایسنا